


MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION NACIONAL DE PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD
COMISION NACIONAL PARA EL ESTUDO DEL TABAQUISMO EN PANAMA
MORTALIDAD ASOCIADA AL COSNUMO DE TABACO EN PANAMA PARA EL PERIODO 2000 – 2010


Con la finalidad de medir el comportamiento de la mortalidad asociada al consumo de tabaco, el Ministerio de Salud de Panamá ha venido valorando una lista básica de patologías asociadas al consumo de tabaco y aplicando la fracción atribuible obtenida a partir de estudios realizados en otros países ya que no contamos con un estudio nacional . Se consideran dos grandes grupos de patologías, los tumores malignos y las otras enfermedades entre las que se incluyen fundamentalmente las cardio respiratorias, según listado adjunto.

Causa	% de la Fracción Atribuible al Tabaco
TUMORES MALIGNOS	
Cáncer de tráquea, bronquios y pulmón	85
Cancer de labio y cavidad bucal	80
Cáncer de Laringe	80
Cáncer de esófago	80
Cáncer de la piel	30
Cáncer de próstata	30
Cáncer de vejiga	30
Cáncer de Mama	30
Cáncer cervicouterino	30
Cáncer de colón, recto y ano	30
Cáncer de páncreas	30
Cáncer de estómago	30
Demás tumores malignos	30
OTRAS ENFERMEDADES	
Enfermedad hipertensiva	24
Enfermedad cerebro vascular	24
Enfermedades isquémicas del corazón	24
Enfermedades Crónicas del Sistema Respiratorio	24
Úlcera gástrica y duodenal	24
Diabetes	24
Aterosclerosis	24


Durante el periodo 2000-2011 en Panamá, se registraron en 149,532 defunciones de las cuales 21040 se asociaron al consumo de tabaco. El promedio de defunciones por todas las causas fue de 13,594 y el promedio de muerte atribuibles al tabaco fue 1913, lo que representa un mortalidad proporcional promedio del 14.2% y nos permite reflejar un descenso porcentual para el periodo de 22.7% en la tasa de mortalidad atribuible al tabaco.



En los años 2001 y 2002 las defunciones por tumores malignos atribuibles al tabaco fueron las mas altas de las reportadas en todo el periodo, en tanto que las otras enfermedades presentaron sus máximos reportes en los años 2003 y 2005 y en todos los años excepto en el 2001 y 2002 el número de defunciones asociadas al tabaco fue mayor dentro del grupo de otras enfermedades.



El comportamiento de la mortalidad asociada al consumo de tabaco muestra un comportamiento descendente tanto para los tumores malignos como para otras enfermedades, sin embargo la tendencia lineal proyectada para el caso de las otras enfermedades presenta una curva ascendente, no así la de los tumores malignos.



Por otra parte, el promedio móvil de las defunciones del periodo utilizando los años inicial y final tiene un comportamiento descendente, así como la tendencia lineal extrapolada. Una situación similar se refleja en la línea de tendencia extrapolado para el caso de la tasa de mortalidad por enfermedades asociadas al consumo de tabaco en Panamá.

